

STIPROL

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

Tên thuốc: STIPROL

Thành phần:

Mỗi 3g có chứa:

Glycerol.....2.25g

Tá dược: Dịch chiết *Chamomile*, Dịch chiết *Mallow*, Tinh bột, Nước cất vừa đủ.

Dạng bào chế: Gel thực trực tràng

Quy cách đóng gói: Tuýp 9 g, tuýp 3 g, 6 tuýp/hộp

Chỉ định:

Điều trị táo bón trong thời gian ngắn giúp cho việc bài tiết nhanh và dễ hơn.

Liều dùng và cách sử dụng:

- **Trẻ em:**

Dùng qua đường trực tràng. 1-2 tuýp 3g thực trong vòng 24 giờ.

- **Người lớn:**

Dùng qua đường trực tràng. 1-2 tuýp 9g thực trong vòng 24 giờ

Không dùng quá 2 tuýp mỗi lần điều trị và không dùng quá liều chỉ định.

Liều dùng có thể được điều chỉnh theo tuổi và triệu chứng.

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với những thành phần của thuốc.
- Không dùng thuốc nhuận tràng cho những bệnh nhân bị đau bụng cấp không rõ nguyên nhân, buồn nôn, ói mửa, tắc ruột, hẹp ruột.
- Bệnh nhân bị chảy máu trực tràng không rõ nguyên nhân, bệnh nhân bị mất nước tiến triển.
- Không dùng dung dịch thực rửa cho những bệnh nhân bị trĩ.

Thận trọng:

Tham khảo ý kiến bác sĩ khi bị táo bón dai dẳng.

Tác dụng không mong muốn:

Tác dụng phụ chủ yếu là do tác dụng gây mất nước của Glycerol. Khi dùng thuốc dạng thụt hậu môn có thể gây khó chịu và mệt mỏi.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với thuốc khác:

Chưa có báo cáo về tương tác với các thuốc khác.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có báo cáo.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng.

Đặc tính dược lực học:

Glycerol là một tác nhân loại nước qua thẩm thấu, có các đặc tính hút ẩm và làm trơn. Glycerol được dùng qua đường trực tràng để hút dịch vào đại tràng và do đó thúc đẩy thải phân khi táo bón. Thuốc gây trơn và làm mềm phân.

Đặc tính dược động học:

Thuốc hấp thu ở trực tràng kém. Chuyển hoá chủ yếu tại gan, 20% lượng thuốc hấp thu chuyển hoá tại thận, chỉ có một phần nhỏ thuốc không chuyển hoá được đào thải qua nước tiểu. Thời gian bán thải 30 - 45 phút.

Quá liều: Chưa có báo cáo nào về các trường hợp quá liều khi dùng Stiprol.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH.

167 Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh.