

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DUNG DỊCH XỊT HỌNG

LAFORIN

sore spray

Giới thiệu:

Đau họng là cảm giác đau, ngứa, rát vùng vòm họng, đau tăng lên khi nói và nuốt. Nguyên nhân thường gặp là do nhiễm khuẩn, thay đổi thời tiết hoặc sống trong không khí khô, ô nhiễm... Các sản phẩm giảm đau họng trên thị trường có thể tác động vào yếu tố nguyên nhân như: vi khuẩn, virus, không khí khô... và kết hợp với các chất có vai trò gây tê, chống viêm giúp giảm nhanh triệu chứng đau họng.

Laforin sore spray có tác động toàn diện, khi kết hợp các thành phần: Chlorhexidine digluconate giúp tiêu diệt 99% vi khuẩn, virus gây bệnh vùng hầu họng, niêm mạc miệng, ngăn ngừa tái nhiễm; Lidocain với tác dụng gây tê, giúp giảm đau rất họng nhanh; Zinc gluconate khi tiếp xúc với niêm mạc họng sẽ giải phóng ion kẽm giúp làm tăng hệ miễn dịch vùng cổ họng, đẩy nhanh quá trình điều trị viêm đau họng; các polyol giữ ẩm vòm họng, tạo lớp màng nhầy bảo vệ niêm mạc vùng hầu họng và khoang miệng. Cuối cùng, tinh dầu bạc hà mang lại cảm giác sảng khoái, dịu niêm mạc cổ họng. Tác động toàn diện làm cho Laforin sore spray giảm đau họng nhanh trong 10 giây và rút ngắn thời gian điều trị viêm họng, viêm amidan...

Thành phần:

Chlorhexidine digluconate (0,2%), lidocaine (0,2%), Zinc gluconate, Propylen glycol, tinh dầu bạc hà và các tá dược khác.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 30 mL.

Công dụng:

- Giảm đau, rất họng nhanh.
- Cải thiện viêm họng, nướu, viêm amidan, loét miệng, viêm nha chu, sau phẫu thuật răng miệng.
- Tăng cường hệ miễn dịch tại vòm họng.
- Tiêu diệt, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong vòm họng.
- Giữ ẩm, tạo lớp màng nhầy bảo vệ vòm họng, làm dịu niêm mạc họng.
- Hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nhiễm vi khuẩn có kèm theo sốt.

Đối tượng không sử dụng:

Quá mẫn với sản phẩm hoặc bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, đặc biệt ở những người có tiền sử có thể có các phản ứng dị ứng liên quan đến chlorhexidine.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Tháo nắp bảo vệ đầu nhún.

Bước 2: Xoay vòi xịt theo hướng vuông góc với thân lọ.

Bước 3: Đưa đầu vòi phun sương vào khoang miệng.

Bước 4: Xịt trực tiếp 3-5 nhát vào vùng hầu họng, khu vực tổ chức bị tổn thương trong khoang miệng. Ngày xịt 6-10 lần.

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: Liều lượng là 3 đến 5 lần xịt. Có thể sử dụng từ 6 đến 10 lần mỗi ngày.

Trẻ em dưới 2 tuổi cần hỏi ý kiến của nhân viên y tế.

Thận trọng:

Tránh tiếp xúc với mắt, để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội

T1-23-080124-T03456-C00301

Kích thước: 95 x 195 mm