

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

LAFORIN CURESPRAY

Chlorhexidin digluconat 0,2% w/v

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần:

Mỗi ml chứa:

Thành phần hoạt chất:

Chlorhexidin digluconat.....0,2% w/v

Thành phần tá dược: Ethanol, neosorb P 20/60, kolliphor RH 40, hương tự nhiên, nước tinh khiết vừa đủ

Dạng bào chế: Dung dịch xịt miệng.

Mô tả: Dung dịch đồng nhất

pH: 4,0 – 8,0

Chỉ định

Ức chế hình thành các mảng bám trên răng.

Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm nướu và vệ sinh răng miệng, đặc biệt trong các trường hợp việc đánh răng không thể thực hiện một cách thường xuyên (ví dụ ở bệnh nhân sau phẫu thuật miệng, bệnh nhân có trở ngại về thể chất hoặc tinh thần, bệnh nhân bị bệnh nan y hoặc suy giảm miễn dịch).

Là liệu pháp trong chế độ điều trị sau phẫu thuật để thúc đẩy quá trình lành nướu.

Kiểm soát loét miệng và nhiễm nấm miệng (viêm miệng do răng giả, tưa miệng, viêm hong, viêm amidan).

Liều dùng và cách dùng

Người lớn:

Xịt thuốc lên bề mặt răng và nướu, các vết loét hoặc các vùng đau khác, sử dụng ngày xịt 2 lần, nên xịt thuốc vào buổi sáng và buổi tối.

Đối với điều trị viêm nướu nên thực hiện một liệu trình khoảng 1 tháng mặc dù có cải thiện điều trị. Trong trường hợp loét áp-tơ (viêm loét miệng) và điều trị nấm miệng cần phải dùng thuốc tiếp tục trong 48 giờ sau khi hết các triệu chứng lâm sàng. Để điều trị viêm miệng do răng giả, răng giả nên được làm sạch trước khi xịt thuốc.

Không dùng quá liều quy định.

Người cao tuổi và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:

Dùng liều tương tự như người lớn trừ khi có khuyến cáo của nha sĩ hoặc bác sĩ.

Trẻ em dưới 12 tuổi: không nên sử dụng trừ khi được các nha sĩ hoặc bác sĩ khuyến dùng.

Đường dùng: Dùng để xịt niêm mạc miệng và răng.

Chống chỉ định

Quá mẫn với chlorhexidin hoặc với bất kì thành phần nào của thuốc. Tuy nhiên những phản ứng quá mẫn này xảy ra rất hiếm.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chỉ dùng để xịt niêm mạc miệng và răng. Hạn chế nuốt. Không để thuốc vào mắt và tai.

Nếu tiếp xúc với mắt, nên rửa sạch ngay với nước.

Trong trường hợp có đau nhức, sưng hoặc kích ứng niêm mạc miệng, cần ngừng sử dụng thuốc và tham khảo ý kiến nha sĩ hoặc bác sĩ.

LAFORIN CURESPRAY không tương thích với các tác nhân anion thường có trong các loại kem đánh răng thông thường, do đó nên dùng thuốc sau khi đánh răng hoặc sử dụng vào lúc khác với thời điểm đánh răng trong ngày.

Trong trường hợp sưng hoặc có khó thở cần ngừng dùng thuốc và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị. Rối loạn tạm thời vị giác và có cảm giác tê, ngứa hoặc cảm giác nóng rất lưỡi có thể xảy ra khi xịt thuốc lần đầu, những tác dụng này sẽ giảm dần khi tiếp tục sử dụng. Nếu tình trạng vẫn còn, cần tham khảo ý kiến nha sĩ hoặc bác sĩ. Có thể xảy ra đổi màu răng hoặc lưỡi, sự đổi màu này là không vĩnh viễn và có thể ngăn chặn bằng cách giảm sử dụng những đồ uống chứa các chất dễ bám màu như cà phê, trà hay rượu vang đỏ. Đối với trường hợp sử dụng răng giả, tình trạng đổi màu có thể ngăn chặn bằng cách vệ sinh răng giả bằng các chất làm sạch thông thường. Trong một số trường hợp có thể cần có biện pháp can thiệp (như đánh mảng bám, đánh bóng) để làm sạch hoàn toàn vết bám.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không có bằng chứng về bất kỳ tác dụng phụ nào đối với thai nhi hoặc trẻ sơ sinh từ việc sử dụng chlorhexidin ở phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Do đó không có khuyến cáo đặc biệt nào được đưa ra dành cho đối tượng này.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Không có báo cáo nào được ghi nhận.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Chlorhexidin không tương thích với các tác nhân anion.

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Các tác dụng không mong muốn dưới đây được liệt kê trong bảng dưới đây theo các hệ cơ quan và tần suất gặp:

Rất thường gặp (ADR $\geq 1/10$) , Thường gặp (1/100 $\leq$ ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 $\leq$ ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10000 $\leq$ ADR < 1/1000), rất hiếm gặp (ADR < 1/10000) và không rõ (không ước tính được từ dữ liệu có sẵn)

Hệ cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn tiêu hóa	Rất thường gặp	Mảng bám trên lưỡi (bựa lưỡi)
	Thường gặp	Khô miệng
	Không rõ	Đổi màu răng, lưỡi Kích ứng miệng Xẹp/sưng niêm mạc miệng Sưng tuyến mang tai
Rối loạn hệ thần kinh	Thường gặp	Mất/rối loạn vị giác Đau lưỡi Giảm/mất cảm giác
Rối loạn hệ thống miễn dịch	Rất hiếm gặp	Quá mẫn, sốc phản vệ

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí

Không có báo cáo về quá liều.

Chlorhexidin nuốt phải hấp thu rất kém. Mặc dù tác dụng toàn thân là không thể ngay cả khi nuốt phải lượng lớn, vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có hướng xử trí phù hợp. Thuốc này có chứa một lượng lớn nồng độ ethanol nên cần phải chú ý nếu trẻ nuốt phải một lượng lớn. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có hướng xử trí phù hợp.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 30ml.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội

T4-24-260326-T04189-NC01362

Kích thước: 95 mm x 185 mm. In 2 mặt
Sửa mục thành phần