

Hướng dẫn sử dụng

Viên đặt

Bicolax SUPP 10mg

Giới thiệu:

Viên đặt chứa Bisacodyl, kích thích niêm mạc ruột già, trực tràng dẫn đến tăng nhu động đại tràng với việc tích tụ nước, điện giải dẫn đến việc kích thích đại tiện và làm mềm phân.

Thành phần:

Bisacodyl, Hardfat

Quy cách đóng gói:

Hộp 5 viên

Chỉ định:

Điều trị táo bón trong thời gian ngắn

Chống chỉ định:

Bisacodyl chống chỉ định ở những bệnh nhân bị tắc ruột, đau bụng cấp tính bao gồm viêm ruột thừa, bệnh viêm ruột cấp tính và đau bụng dữ dội kèm theo các triệu chứng buồn nôn, nôn là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng bệnh nghiêm trọng. Bisacodyl cũng chống chỉ định trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và ở những bệnh nhân đã biết quá mẫn cảm với bisacodyl hoặc bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm.

Viên đạn bisacodyl không nên được sử dụng khi có vết nứt hậu môn hoặc viêm loét trực tràng với tổn thương niêm mạc.

Hướng dẫn sử dụng:

Điều trị táo bón, hoặc bệnh cần thông ruột dễ dàng hơn:

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi:

Liều thông thường là 1 viên/ngày

Nếu không có chỉ dẫn khác không nên sử dụng vượt quá 1 viên/ngày

Trẻ em dưới 10 tuổi:

Bicolax supp 10mg không phù hợp với trẻ dưới 10 tuổi, với trẻ dưới 10 tuổi nên sử dụng sản phẩm Bicolax supp 5mg

Cách dùng:

Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước ấm hoặc nước muối loãng. Sau đó lau khô nhẹ nhàng

Bạn dùng tay đẩy viên đạn theo hướng đi của viên đạn vào sâu trong hậu môn từ 2-3cm sao cho tay bạn không chạm đến viên đạn.

Thận trọng và cảnh báo:

Như với tất cả các sản phẩm nhuận tràng, viên đạn Bisacodyl không nên được sử dụng hàng ngày liên tục trong hơn năm ngày.

Sử dụng trong thời gian quá dài và liều cao có thể dẫn đến mất cân bằng nước, điện giải và hạ kali máu.

Bệnh nhân có thể gặp phải chứng xuất huyết (máu trong phân) nhẹ

Chóng mặt và / hoặc ngất đã được báo cáo ở những bệnh nhân đã sử dụng viên đạn Bisacodyl.

Đã có báo cáo riêng biệt về đau bụng và tiêu chảy ra máu xảy ra sau khi dùng bisacodyl. Một số trường hợp đã được chứng minh là có liên quan đến thiếu máu niêm mạc đại tràng.

Việc sử dụng viên đạn có thể dẫn đến cảm giác đau và kích thích tại chỗ, đặc biệt là ở những bệnh nhân bị nứt hậu môn và viêm loét trực tràng và viêm loét trực tràng với tổn thương niêm mạc.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội