

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

UNI-ATROPIN^{0.5%}

Giới thiệu:

Dung dịch nhỏ mắt UNI-ATROPIN 0.5% chứa 0.5% Atropin sulfat, được sử dụng để xác định tật khúc xạ và hỗ trợ điều trị viêm mống mắt và viêm màng bồ đào.

Thành phần:

Mỗi ml dung dịch chứa 5 mg Atropin sulfat (0.5%)

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt.

Quy cách đóng gói:

0,5 ml/ống. Hộp 20 ống.

Công dụng:

- Hỗ trợ điều trị viêm mống mắt và viêm màng bồ đào để làm liệt cơ mống mắt, cơ mi và để phòng ngừa hoặc loại bỏ sự kết dính.

- Atropin sulfat có tác dụng làm liệt thể mi mạnh vì vậy dùng trong xác định tật khúc xạ ở trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em bị lác mắt hội tụ.

Đối tượng không sử dụng:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không dùng cho bệnh nhân tăng nhãn áp góc đóng. Không dùng ở những bệnh nhân có góc hẹp giữa mống mắt và giác mạc.

Liều dùng và cách dùng:

Dùng để nhỏ mắt

Soi góc tiền phòng nên được thực hiện trước khi sử dụng sản phẩm.

Người lớn:

Tật khúc xạ: 1 – 2 giọt, 1 giờ trước đo.

Viêm màng bồ đào, viêm mống mắt: 1 – 2 giọt, tối đa 4 lần/ngày.

Người cao tuổi: sử dụng thận trọng ở người cao tuổi và những đối tượng có nguy cơ tăng nhãn áp.

Trẻ em:

Tật khúc xạ: 1 giọt, 2 lần/ngày, 1 – 3 ngày trước khi kiểm tra.

Viêm màng bồ đào, viêm mống mắt: 1 giọt, tối đa 3 lần/ngày.

Cách nhỏ:



Vành mi dưới, nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch vào mắt theo hướng dẫn.



Dùng ngón tay trở chẹn vào điểm lệ ở góc trong của mắt khoảng 1 phút.

Thận trọng và cảnh báo:

Không nên sử dụng khi lái xe hoặc vận hành máy móc tàu xe.

Thận trọng ở những bệnh nhân có thể tăng áp lực nội nhãn.

Bệnh nhân cần được cảnh báo rằng sẽ giảm tạm thời thị lực sau khi sử dụng sản phẩm.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

T4-22-200923-T02895-C00783